

Fastställda karenstider för biocidprodukter

Senast uppdaterad: 2019-12-17

För fullständiga gällande beslut för samtliga produkter hänvisas till [Bekämpningsmedelsregistret](#).

Produkt	Reg. nr	Aktiv substans	Användning	Karens
Absorbine Ultrashield Brand Residual Insecticide	4757	Permetrin Pyretriner	Mot bitande och stickande insekter på häst	Häst: Behandlade djur får gå till livsmedelsproduktion tidigast 60 dygn efter avslutad behandling. Journal ska föras över genomförda behandlingar.
Centaura	4946	Ikaridin	Mot mygg och bitandeflugor Minskar risken för bett av fästing För användning på människa och häst	Häst: Behandlade djur får gå till livsmedelsproduktion tidigast 60 dygn efter avslutad behandling.
CLAC Lotion	4945	Ikaridin	Mot bitande insekter på hästar	Häst: Behandlade djur får gå till livsmedelsproduktion tidigast 60 dygn efter avslutad behandling.
Degesch Plate	5193	Magnesiumfosfid	Mot skadeinsekter i silos, lagerlokaler och liknande utrymmen. Mot skadeinsekter i lastutrymmen på fartyg.	Livsmedel och foder: Efter gasning och ventilation med avseende på arbetsplatssäkerhet ska livsmedel och foder ventileras ytterligare 7 dagar (karenstid) före vidare bruk eller försäljning.
DR 1	4830	Ikaridin	Mot mygg, knott och broms Minskar risken för bett av fästing	Häst: Behandlade djur får gå till livsmedelsproduktion tidigast 60 dygn efter avslutad behandling.
Effol Broms Blockare +	5038	Ikaridin	Mot mygg och bitandeflugor Minskar risken för bett av fästing För användning på häst	Häst: Behandlade djur får gå till livsmedelsproduktion tidigast 60 dygn efter avslutad behandling.

Phostoxin	5192	Aluminiumfosfid	Mot skadeinsekter i silos, lagerlokaler och liknande utrymmen. Mot skadeinsekter i lastutrymmen på fartyg.	Livsmedel och foder: Efter gasning och ventilation med avseende på arbetsplatssäkerhet ska livsmedel och foder ventileras ytterligare 3 dagar (karenstid) före vidare bruk eller försäljning.
Renons Flugkräm	4787	Ikaridin	Mot mygg och bitandeflugor Minskar risken för bett av fästing För användning på häst	Häst: Behandlade djur får gå till livsmedelsproduktion tidigast 60 dygn efter avslutad behandling.
Renons Flugmedel	4788	Ikaridin	Mot mygg och bitandeflugor Minskar risken för bett av fästing För användning på häst	Häst: Behandlade djur får gå till livsmedelsproduktion tidigast 60 dygn efter avslutad behandling.
Renons Mygg & Fästingmedel Spray	4922	Ikaridin	Mot mygg och bitandeflugor Minskar risken för bett av fästing För användning på människa och häst	Häst: Behandlade djur får gå till livsmedelsproduktion tidigast 60 dygn efter avslutad behandling.
Stald chok flugspray D	5108	Pyretrumextrakt	Mot flygande insekter inomhus i bostäder och häststallar. För bekämpning av getingbon i och omkring byggnader.	Häst: Produkten får inte användas i andra djurhållningslokaler än häststall. Exponerade hästar får gå till livsmedelsproduktion tidigast 60 dagar efter senaste appliceringen.