

Villkor för användning av Galera

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Höstraps och höstrybs		Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 30-50 Endast vår- behandling	1 gång per år			0,3 L/ha	80 g klopyralid/ha 20 g pikloram/ha		X
Vårraps och vårtrybs		Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 12-14	1 gång vart tredje år			0,3 L/ha	80 g klopyralid/ha 20 g pikloram/ha		X

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Anpassade skyddsavstånd vid spridning	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	X
Hantering av växtmaterial från behandlad gröda	Växtmaterial från en behandlad gröda får inte transporteras från det egna jordbruket för kompostering eller biogasproduktion. Växtmaterial från en behandlad gröda får inte användas i växthus, svampproduktion eller som täckmaterial för växter.	Produkten innehåller klopyralid är persistent och kan finnas kvar i restmaterial och kan skada känsliga grödor.	X
Skydd för efterföljande grödor	Produkten innehåller verksamma ämnen som kan skada efterföljande grödor om odling sker tidigare än följande tid efter behandling med produkten: - 30 dagar för omsådd med stråsåd, raps, rybs, gräs, sockerbetor och majs - 12 månader: potatis, tomat, morötter andra flockblommiga växter, baljväxter, sallat och kål.	Produkten innehåller klopyralid som kan skada efterföljande grödor.	X